



DRENAJES PERCUTÁNEOS

Procedimiento Ambulatorio.

¿Qué es un Drenaje percutáneo?

Es un procedimiento por medio del cual se **saca o toma una muestra (líquido del cuerpo, parte de un órgano o cavidad)** a través de una **punción (pinchazo)** que se hace a la piel con una **aguja hueca o catéter percutáneo**, se realiza apoyado con la imagen de un **ecógrafo o un tomógrafo**. La punción con la aguja puede ser **un poco dolorosa** por lo que se aplica un medicamento (**anestésico local**).



Para solicitar la cita de su examen debe contar con los **siguientes requisitos**:

- **Orden médica.**
- **Autorización** de servicio de su aseguradora, vigente.
- **Cancele** copago o cuota moderadora si se requiere.
- Estas citas siempre se coordinarán con el **área de ecografía y tomografía**, según aplique.
- Si está tomando alguno de los siguientes **anticoagulantes como: warfarina, heparina, coumadin, clopidogrel, persantin, liquemine, ecotrin, plavix, clexane, iscover, fraxiparine, aspirina, cardioaspirina, ticagrelor, brilinta, prasugrel, efient, xarelto, apixaban, eliquis, edoxaban, clenox, rivaroxabán**; por favor, **consulte con su médico** tratante el manejo que se le dará a su terapia de coagulación, y debe **informarle al servicio de imágenes diagnósticas**, desde el momento de la solicitud de la cita.

Preparación y Recomendaciones.

Estimado **usuario**, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:

- **No suspenda Clopidogrel si lo toma.**
- Suspenda los **anticoagulantes, aspirina o sus derivados (Mejoral, Asawin, Alka-Seltzer, entre otros) 5 días** antes del examen, únicamente si su **médico tratante** ya le ha hablado de la seguridad de hacerlo.
- Si usted toma algún **medicamento homeopático** como, **ginkgo biloba, St. John's wort**, suspender **5 días** antes del procedimiento.



EL DÍA ANTERIOR:

- Debe tomarse pruebas de **coagulación (TP-TPT-INR)** y **hemograma** el día anterior drenaje, en el caso de que se encuentren alterados informar al **radiólogo intervencionista** de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.



EL DÍA DEL EXAMEN:

- **Acuda con acompañante adulto.**
- **No ingiera alimentos 4 horas** previas al procedimiento.
- Presente los reportes de **laboratorios (TP-TPT-INR y hemograma)**, no mayor a **5 días**.
- Si cuenta con **imágenes tomadas previamente**, presentarlos al radiólogo antes de la realización del procedimiento.
- Preséntese en **Clinica Medilaser S.A.S.**, **30 minutos** antes del examen, diríjase a recepción, con la **orden médica, autorización vigente, copia de la historia clínica y valor del copago (si aplica)**.



POSTERIOR AL EXAMEN:

- **Retire el apósito** del sitio del drenaje a las **24 horas**, no humedecerlo.
- **Evite realizar esfuerzos durante 48 horas.**
- **Control** de tensión arterial cada **15 minutos** por **2 horas**.
- **Vigilar patrón respiratorio.**
- En caso de **estudios al líquido extraído**, los resultados dependerán del tipo de estudio solicitado.



DRENAJES PERCUTÁNEOS

Procedimiento Hospitalario.

¿Qué es un Drenaje percutáneo?

Es un procedimiento por medio del cual se **saca o toma una muestra (líquido del cuerpo, parte de un órgano o cavidad)** a través de una **punción (pinchazo)** que se hace a la piel con una **aguja hueca o catéter percutáneo**, se realiza apoyado con la imagen de un **ecógrafo o un tomógrafo**. La punción con la aguja puede ser **un poco dolorosa** por lo que se aplica un medicamento (**anestésico local**).



Para solicitar la realización del examen debe:

- Realizar la verificación redundante de los datos del paciente.
- Verificar en la evolución médica de la historia clínica que se encuentre ordenado **el procedimiento**.
- Verificar si el examen se encuentra cargado en módulo de **procedimientos no quirúrgicos**.
- Solicite la realización del **drenaje** guiado por **ecografía** y guiado por **tomografía**, según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones.



RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

El equipo de Enfermería antes del examen deben:

- Suspender anticoagulante, aspirina o sus derivados (**Mejoral, Asawin, Alka-Seltzer**) **5 días antes**.
- Tomar pruebas de coagulación (TP - TPT- INR), hemograma el día anterior al drenaje, en el caso de que se encuentren alterados informar al **radiólogo intervencionista** de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.



EL DÍA DEL EXAMEN:

- Enviar el paciente en camilla, con acompañante y camillero.
- Garantizar el ayuno de **4 horas previas** al procedimiento.
- Enviar los siguientes insumos:
 - ✓ 2 Jeringas de 10 ml.
 - ✓ 2 Ampollas de lidocaína al 2% sin epinefrina.
 - ✓ 1 Par guantes estériles 7 1/2.
 - ✓ 1 Hoja de bisturí N°11.
 - Insumos para drenajes:
 - 1 Catéter 10 FR.
 - 2 Jeringas de 10 ml.
 - 1 Jeringa de 50 ml.
 - 1 Ampolla de lidocaína al 2% sin epinefrina.
 - 1 Par guantes estériles 7 1/2.
 - 1 Equipo de macrogoteo.
 - 1 Equipo cistoflo.
 - 1 Hoja de bisturí N° 11.
 - 1 Seda 2-0 aguja recta.
 - 1 catéter calibre N° 14.



POSTERIOR AL EXAMEN:

- Retirar el **apósito** del sitio de toma de la biopsia o drenaje a las **24 horas**, **no humedecerlo**.
- Evitar realizar esfuerzos durante **48 horas**.
- Control de tensión arterial cada **15 minutos por 2 horas**.
- Vigilar **patrón respiratorio**.
- Solicitar **dieta según orden médica**.
- En caso de **estudios al líquido extraído**, los resultados dependerán del tipo de estudio solicitado.