



## NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA

Procedimiento Ambulatorio.

### ¿Qué es una Nefrostomía percutánea?

Procedimiento realizado por radiólogo intervencionista que consiste en la colocación de un catéter en el interior de la pelvis renal mediante una punción a través de la piel, guiada por algún método de imagen (**ultrasonido, tomografía computarizada o fluoroscopia**). Las principales indicaciones de la nefrostomía son: **Uropatía obstructiva (85-90%), litiasis es la más frecuente, coágulos de sangre, fibrosis post-quirúrgica o enfermedad maligna como cáncer cervicouterino, masas adenopáticas, cáncer de próstata.**



Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:

- Orden médica.
- Autorización de servicio de su aseguradora, vigente.
- Cancele copago o cuota moderadora si se requiere.
- Si sospecha estar embarazada avise al personal de imagenología, antes del examen.
- Si está tomando alguno de los siguientes **anticoagulantes como: warfarina, heparina, coumadin, clopidogrel, persantin, liquemine, ecotrin, plavix, clexane, iscover, fraxiparine, aspirina, cardioaspirina, ticagrelor, brilinta, prasugrel, efient, xarelto, apixaban, eliquis, edoxaban, clenox, rivaroxabán**; por favor, **consulte con su médico** tratante el manejo que se le dará a su terapia de coagulación, y debe **informarle al servicio de imágenes diagnósticas**, desde el momento de la solicitud de la cita.

### Preparación y Recomendaciones.

Estimado usuario, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:

- **No suspenda Clopidogrel si lo toma.**
- Suspenda los **anticoagulantes, aspirina o sus derivados (Mejoral, Asawin, Alka-Seltzer, entre otros) 5 días** antes del examen, únicamente si su médico tratante ya le ha hablado de la seguridad de hacerlo.
- Si usted toma algún medicamento **homeopático** como, **ginkgo biloba, St. John`swort, suspender 5 días** antes del procedimiento.



#### EL DÍA ANTERIOR:

- Debe tomarse pruebas de **coagulación (TP-TPT-INR)** y **hemograma** el día anterior drenaje, en el caso de que se encuentren alterados informar al **radiólogo intervencionista** de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.
- Si consume medicamentos hipertensivos **NO suspender.**



#### EL DÍA DEL EXAMEN:

- **No ingiera alimentos 4 horas previas** al procedimiento.
- Lleve el **reporte de los exámenes de laboratorio** para el examen (**TP-PTP-INR y hemograma**) que **no superen los 5 días.**
- **Asista con un acompañante adulto.**
- Si cuenta con **imágenes tomadas previamente**, historia clínica previa y presentarlos al radiólogo antes de la realización del **procedimiento.**
- Preséntese en **Clinica Medilaser S.A.S., 30 minutos** antes del examen, diríjase a la oficina central de citas o recepción, con la **orden médica, autorización vigente, copia de la historia clínica y valor del copago (si aplica).**



#### POSTERIOR AL EXAMEN:

- **Inicie con dieta líquida**, si la tolera avance a dieta blanda, y si tolera luego la dieta habitual que está acostumbrado a llevar.
- **Retire** el apósito del sitio puncionado a las **24 horas, no lo humedezca.**
- **Evite** realizar esfuerzos respiratorios durante **48 horas.**
- **Si aparece dolor**, tome analgésicos ordenados según orden médica.
- **Control** de tensión arterial cada **15 minutos por 2 horas.**
- El **reporte** del procedimiento será entregado inmediatamente después de terminarlo.



## NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA

Procedimiento Hospitalario.

### ¿Qué es una Nefrostomía percutánea?

Procedimiento realizado por radiólogo intervencionista que consiste en la colocación de un catéter en el interior de la pelvis renal mediante una punción a través de la piel, guiada por algún método de imagen (*ultrasonido, tomografía computarizada o fluoroscopia*). Las principales indicaciones de la *nefrostomía* son: *Uropatía obstructiva (85-90%), litiasis es la más frecuente, coágulos de sangre, fibrosis post-quirúrgica o enfermedad maligna como cáncer cervicouterino, masas adenopáticas, cáncer de próstata.*

### Para solicitar la realización del examen debe:

- Realizar la verificación redundante de los datos del paciente.
- Verificar que el procedimiento se encuentre ordenado en la evolución médica de la historia clínica.
- Verificar que la orden se encuentra cargada en **procedimiento no quirúrgico** de la historia clínica.
- Solicite la realización de la *nefrostomía percutánea* según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones.

### RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

El equipo de Enfermería antes del examen deben:

- Suspender anticoagulante, aspirina o sus derivados (Mejoral, Asawin, Alka-Seltzer) 5 días antes.
- Tomar pruebas de coagulación (TP - TPT- INR), hemograma el día anterior a la nefrostomía, en el caso de que se encuentren alterados informar al radiólogo intervencionista de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.



### EL DÍA DEL EXAMEN:

- Enviar el paciente en camilla, con acompañante y camillero.
- Garantizar el ayuno de 4 horas previas al procedimiento.
- Enviar los siguientes insumos:
  - ✓ 1 Catéter 8 Fr.
  - ✓ 2 Jeringas de 50 ml
  - ✓ 1 Par de guantes estériles talla 7 1/2.
  - ✓ 1 Equipo Macrogoteo
  - ✓ 1 Cystoflo.
  - ✓ 1 Hoja de Bisturí N° 11.
  - ✓ 1 Seda 2/0 con aguja recta.



### POSTERIOR AL EXAMEN:

- Solicitar dieta según evolución médica.
- Retirar el apósito del sitio puncionado a las 24 horas, no humedecerlo.
- Evitar realizar esfuerzos respiratorios durante 48 horas.
- Si aparece dolor administrar analgésicos ordenados según orden médica.
- Control de tensión arterial cada 15 minutos por 2 horas.
- El reporte del procedimiento será entregado inmediatamente después de terminarlo.