



TORACENTESIS

Procedimiento Ambulatorio.

¿Qué es una Toracentesis guiada por ecografía?

La toracentesis es un procedimiento que se realiza para detectar la causa de la **acumulación de líquidos**, y con fines terapéuticos para retirarlos del **espacio pleural**, aliviando los síntomas de su acumulación, en este caso se utilizan **imágenes de ecografía** para realizar la punción.



Para solicitar la cita de su examen debe contar con los **siguientes requisitos**:

- Orden médica.
- Autorización de servicio de su aseguradora, vigente.
- Cancele copago o cuota moderadora, si se requiere.

Preparación y Recomendaciones.

Estimado **usuario**, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:



EL DÍA ANTERIOR:

- Debe tomarse **pruebas de coagulación (TP - TPT- INR)**, hemograma el día anterior a la **paracentesis**, en el caso de que se encuentren alterados informar al **radiólogo intervencionista** de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.
- Si consume **medicamentos hipertensivos**, **NO** es necesario suspenderlos.



EL DÍA DEL EXAMEN:

- **No requiere ayuno.**
- Lleve el **reporte** de los exámenes de laboratorio para el **examen (TP-PTP-INR y hemograma)** que **no superen los 5 días**.
- **Acuda con un acompañante adulto.**
- Si cuenta con **imágenes tomadas previamente**, historia clínica previa y presentarlos al radiólogo antes de la realización del procedimiento.
- Preséntese en **Clinica Medilaser S.A.S.**, **30 minutos** antes del examen, diríjase a la oficina central de citas o recepción, con la **orden médica**, **autorización vigente**, **copia de la historia clínica y valor del copago (si aplica)**.



POSTERIOR AL EXAMEN:

- Inicie dieta líquida, según tolerancia y continuar con dieta blanda y luego normal.
- **No** realice actividades físicas que sobrelleven **exceso de fuerza o sobrecarga física** durante **48 horas**.
- **Use medios físicos para el control del dolor**, como colocación de **hielo** en zona de punción.
- **Use analgésicos** orales según prescripción médica (**tener en cuenta alergias a medicamentos**).
- **Repose y permanezca** bajo vigilancia de un adulto las siguientes 4 horas, puede sentirse mareado o cansado.
- Vigile la aparición de **signos de alarma** como, dolor agudo, inflamaciones, sangrado. Si alguno de estos síntomas es de **difícil manejo** y persiste, acuda al servicio de **urgencias**.
- **Retire el apósito** del sitio de punción a las **24 horas**, **no lo humedezca**.
- El **reporte** del procedimiento será entregado inmediatamente, aunque si hay estudios para envío a patología, el resultado será entregado en un plazo de **15 días calendario**.
- El **reporte del procedimiento** será entregado inmediatamente, pero si hay muestras por procesar el resultado será entregado.



TORACENTESIS

Procedimiento Hospitalario.

¿Qué es una Toracentesis guiada por ecografía?

La **toracentesis** es un procedimiento que se realiza para detectar la causa de la **acumulación de líquidos**, y con fines terapéuticos para retirarlos del **espacio pleural**, aliviando los síntomas de su acumulación, en este caso se utilizan **imágenes de ecografía** para realizar la punción.



Para solicitar la realización del examen debe:

- **Realizar** la verificación redundante de los datos del paciente.
- **Verificar** que el procedimiento se encuentre ordenado en la evolución médica de la historia clínica.
- **Verificar** que la orden se encuentra cargada en **procedimiento no quirúrgico** de la historia clínica.
- **Solicite** la realización de la **paracentesis** guiada por **ecografía**, según orden médica y especificaciones redactadas en campo de observaciones.



RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

El equipo de Enfermería antes del examen deben:

- **Suspender anticoagulante**, aspirina o sus derivados (**Mejoral, Asawin, Alka-Seltzer**) 5 días antes.
- Tomar pruebas de **coagulación (TP - TPT- INR)**, **hemograma** el día de la paracentesis, en el caso de que se encuentren alterados informar al **radiólogo intervencionista** de manera previa para la toma de decisión sobre la realización del procedimiento.



EL DÍA DEL EXAMEN:

- **Enviar el paciente** en camilla, con acompañante y camillero.
- **No requiere ayuno.**
- **Enviar los siguientes insumos:**
 - ✓1 Catéter N° 14.
 - ✓1 Jeringa de 50 ml.
 - ✓1 Par Guantes estériles talla 7 1/2.
 - ✓1 ampolla de Lidocaína al 2% sin epinefrina x 10 ml.
 - ✓1 Jeringa de 10 ml.
 - ✓1 Equipo de macrogoteo.
 - ✓1 Cistoflo.
 - ✓Si el paciente es de contextura gruesa, solicitar catéter de 10 Fr.



POSTERIOR AL EXAMEN:

- **Tomar radiografía de tórax.**
- **Retirar el apósito** del sitio del drenaje a las **24 horas**, no humedecerlo.
- **Evitar** realizar esfuerzos durante **48 horas**.
- **Si aparece dolor**, administrar analgésicos según **orden médica**.
- **Control de tensión arterial** cada **15 minutos** por **2 horas**.
- **Vigilar patrón respiratorio.**
- **Solicitar dieta** según **orden médica**.
- **El reporte** del procedimiento será entregado inmediatamente después del procedimiento, pero si hay **muestras por procesar**, gestionar el resultado con el laboratorio clínico y/o de patología según el caso.